COADYUVANTE AGRÍCOLA

ALEACCION 80 OD

Dispersión en aceite (OD)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	DENSIDAD (20 °C)
Aceite vegetal (adyuvante/aceite...	520 g/L + 250 g/L + 30 g/L	Dispersión en aceite	—	No. 7708	1.04 g/ml

1 DESCRIPCIÓN

Aceite de origen vegetal emulsionable que se agrega al caldo para que el producto moje mejor la hoja y se pegue más. Ayuda a que el fungicida o insecticida rinda más con la misma dosis. Emulsionante que permite que el aceite se mezcle bien con el agua de aspersión y se reparta sobre la hoja. Humectante de silicona que hace que el caldo se extienda en una capa fina sobre la hoja y penetre mejor, incluso con lluvia a las pocas horas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Adyuvante: mejora humectación, adherencia y penetración cuticular del plaguicida; también acción física sobre insectos de cuerpo blando. Emulsionante y humectante no iónico: emulsifica el aceite en agua y mejora la cobertura del caldo. Reduce drásticamente la tensión superficial (superhumectante): extiende el caldo, favorece entrada por estomas y rapidez de absorción.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Aceite vegetal (adyuvante/aceite emulsionable) Triglicéridos de ácidos grasos (soya/canola, metilados o no)	520 g/L (52% p/v)
Polioxietileno (20) trioleato de sorbitán (Polisorbato 85) Éster de ácido graso de sorbitán etoxilado (tensoactivo no iónico)	250 g/L (25% p/v)
Trisiloxano modificado con poliéter (superhumectante organosiliconado) Copolímero organosilicona-poliéter	30 g/L (3% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Triglicéridos de ácidos grasos (soya/canola, metilados o no) / Éster de ácido graso de sorbitán etoxilado (tensoactivo no iónico) / Copolímero organosilicona-poliéter
Grupo de resistencia: No aplica

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Uso	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Banano/Plátano *Musa spp.*	Portador de fungicidas para Sigatoka negra (aspersión aérea/terrestre)	200–400 mL	0 ‡
Arroz *Oryza sativa*	Adyuvante en herbicidas y fungicidas	200–400 mL	0 ‡
Cítricos *Citrus spp.*	Adyuvante en insecticidas/acaricidas	200–400 mL	0 ‡
Tomate *Solanum lycopersicum*	Adyuvante en fungicidas e insecticidas	200–400 mL	0 ‡

Reentrada: 4 horas.
Intervalo: según plaguicida asociado · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · Respete el máximo de aplicaciones de la etiqueta.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-CO-05Y4-2A.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 USOS PRINCIPALES

- **Portador de fungicidas para Sigatoka negra**
  aspersión aérea/terrestre
- **Adyuvante en herbicidas y fungicidas**
- **Adyuvante en insecticidas/acaricidas**
- **Adyuvante en fungicidas e insecticidas**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN



Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD



Líquido concentrado



Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN



Utilice guantes



Utilice botas



Utilice overol



Protección boca y nariz



Protección ocular



Lávese después del uso

D AMBIENTE



Dañino para animales

E ENVASES



Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN Clase OMS U

BANDA Banda verde (PMS 347 C) · Categoría 5 · Clase OMS U



GHS07
Nocivo / irritante

H319 Provoca irritación ocular grave. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-CO-05Y4-2A.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato