FUNGICIDA BOTÁNICO

EKO LATEX 43 SL

Concentrado soluble (SL)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	REENTRADA
Caña de azúcar (Saccharum offici...	430 g/L	Concentrado soluble	—	No. 8063	4 horas

1 DESCRIPCIÓN

Producto derivado de la caña de azúcar (melaza o extracto) usado como bioestimulante, fuente de energía microbiana y atrayente en cebos.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sin modo de acción pesticida directo; fuente de carbono y azúcares que estimula microorganismos benéficos o sirve de atrayente/adherente.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Caña de azúcar (Saccharum officinarum) — extracto/melaza Extracto vegetal (azúcares)	430 g/L (43% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Extracto vegetal (azúcares)
Grupo de resistencia: No aplica

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate *Solanum lycopersicum*	Complemento nutricional; cebo atrayente para moscas	1.0–2.0	0 ‡
Banano/plátano *Musa spp.*	Complemento a biofertilización	1.0–2.0	0 ‡
Cítricos *Citrus spp.*	Cebo para mosca de la fruta (mezclado con proteína/spinosad)	1.0–2.0	0 ‡

Reentrada: 4 horas.
Intervalo: 7–15 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Sin límite.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-FB-067Z-EA.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- **Complemento nutricional**
- **Cebo atrayente para moscas**
- **Complemento a biofertilización**
- **Cebo para mosca de la fruta** *mezclado con proteína/spinosad*

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN

Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD

Líquido concentrado

Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN

Utilice guantes

Utilice botas

Utilice overol

Protección boca y nariz

Protección ocular

Lávese después del uso

D AMBIENTE

Dañino para animales

Dañino para peces

E ENVASES

Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PRECAUCIÓN Clase OMS U

BANDA Banda verde · Clase OMS U

No clasificado como peligroso según el SGA. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato