FUNGICIDA-INSECTICIDA AGRÍCOLA

PREVISOR SEMILLA PLUS 30 WP

Polvo mojable (WP)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	REENTRADA
Imidacloprid + Metalaxil + Tiram...	100 g/kg + 100 g/kg + 100 g/kg	Polvo mojable	IRAC 4A	No. 5900	48 horas

1 DESCRIPCIÓN

Insecticida sistémico que controla mosca blanca, pulgones, trips, chinches, cochinillas y gusanos del suelo. En salud pública se usa en cebos y tratamientos contra cucarachas y hormigas. Fungicida sistémico específico para oomicetos (mildiu, Phytophthora, Pythium) con acción curativa. Fungicida protectante usado sobre todo para tratar semillas contra hongos del suelo y del grano (Pythium, Rhizoctonia, Fusarium).

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Agonista del receptor nicotínico de acetilcolina; sistémico (xilema), contacto e ingestión. Sistémico; inhibe la ARN polimerasa I (síntesis de ARN ribosomal) de oomicetos. Contacto multisitio protectante; reacciona con grupos tiol de enzimas del hongo.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Imidacloprid Neonicotinoide (cloronicotinilo)	100 g/kg (10% p/p)
Metalaxil Fenilamida (acilalaninato)	100 g/kg (10% p/p)
Tiram (TMTD) Ditiocarbamato (tiuram disulfuro)	100 g/kg (10% p/p)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Neonicotinoide (cloronicotinilo) / Fenilamida (acilalaninato) / Ditiocarbamato (tiuram disulfuro)
Grupo de resistencia: IRAC 4A · FRAC 4 · FRAC M03

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis de uso	Carencia (días)
Tomate *Solanum lycopersicum*	Mosca blanca (Bemisia tabaci), pulgones, trips	250–300 g por cada 100 kg de semilla	7
Ají/Pimiento *Capsicum annuum*	Mosca blanca, pulgones, picudo	250–300 g por cada 100 kg de semilla	0
Repollo/Brócoli *Brassica oleracea*	Pulgones, mosca blanca	250–300 g por cada 100 kg de semilla	7
Papa *Solanum tuberosum*	Pulgón, pulguilla, escarabajo	250–300 g por cada 100 kg de semilla	7
Pepino *Cucumis sativus*	Mosca blanca, pulgones	250–300 g por cada 100 kg de semilla	0
Cítricos *Citrus spp.*	Psílido asiático, minador, pulgones	250–300 g por cada 100 kg de semilla	0
Café *Coffea arabica*	Minador, broca, cochinillas	250–300 g por cada 100 kg de semilla	14 ‡

Reentrada: 48 horas.
Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. ≈0.45 kg i.a./ha/año (EPA, hortalizas).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-FI-04JW-19.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Mosca blanca** *Bemisia tabaci*
- **Pulgones**
- **Trips**
- **Picudo**
- **Pulgón**
- **Pulguilla**
- **Escarabajo**
- **Psílido asiático**
- **Minador**
- **Broca**
- **Cochinillas**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis premezclada y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN



Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD



Material seco concentrado



Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN



Utilice guantes



Utilice botas



Utilice overol



Utilice respirador



Protección facial



Lávese después del uso

D AMBIENTE



Dañino para animales



Dañino para peces

E ENVASES



Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO Clase OMS II

BANDA Banda amarilla (PMS 101 C) · Categoría 3 · Clase OMS II



GHS07 Nocivo / irritante



GHS09 Muy tóxico para la vida acuática



GHS05 Corrosivo



GHS08 Peligro grave para la salud

H302 Nocivo en caso de ingestión. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H318 Provoca lesiones oculares graves. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H332 Nocivo en caso de inhalación. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672** Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato