FUNGICIDA AGRÍCOLA

LUCERNA 25.18 EW

Emulsión aceite en agua (EW)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	DENSIDAD (20 °C)
Citrato de plata + Piraclostrobi...	1.8 g/L + 250 g/L	Emulsión aceite en agua	FRAC 11	No. 7362	1.04 g/ml

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida estrobilurina de amplio espectro con efecto fisiológico (planta más verde). Se usa solo o con boscalid o metiram. Sal de plata de acción antimicrobiana de contacto, usada en pequeñas cantidades como complemento de fungicidas sistémicos en mezclas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Translaminar y preventivo; inhibe la respiración mitocondrial (QoI, complejo III). Contacto multisitio; los iones plata inactivan enzimas y membranas de hongos y bacterias.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Citrato de plata Sal de plata (antimicrobiano inorgánico)	1.8 g/L (0.18% p/v)
Piraclostrobina Estrobilurina (metoxicarbamato)	250 g/L (25% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Estrobilurina (metoxicarbamato) / Sal de plata (antimicrobiano inorgánico)
Grupo de resistencia: FRAC 11 · FRAC M

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Banano *Musa spp.*	Sigatoka negra	400–600 mL	3 ‡
Tomate *Solanum lycopersicum*	Tizón temprano, tizón tardío, oídio, antracnosis	400–600 mL	1 ‡
Papa *Solanum tuberosum*	Tizón temprano, mancha plateada	400–600 mL	3 ‡
Cucurbitáceas *Cucumis, Cucurbita, Citrullus spp.*	Oídio, mildiu, antracnosis	400–600 mL	7 ‡
Cebolla *Allium cepa*	Mancha púrpura, mildiu	400–600 mL	7 ‡
Café *Coffea arabica*	Roya, cercospora	400–600 mL	45 ‡
Arroz *Oryza sativa*	Añublo de la vaina, piricularia	400–600 mL	—
Ají/pimiento		400–600 mL	0

Reentrada: 12 horas.
Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 2–3 aplicaciones QoI por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- **Sigatoka negra**
- **Tizón temprano**
- **Tizón tardío**
- **Oídio**
- **Antracnosis**
- **Mancha plateada**
- **Mildiu**
- **Mancha púrpura**
- **Roya**
- **Cercospora**
- **Añublo de la vaina**
- **Piricularia**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN



Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD



Líquido concentrado



Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN



Utilice guantes



Utilice botas



Utilice overol



Utilice respirador



Protección ocular



Lávese después del uso

D AMBIENTE



Dañino para animales



Dañino para peces

E ENVASES



Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO Clase OMS U

BANDA Banda verde (PMS 347 C) · Categoría 5 · Clase OMS U



GHS06 Toxicidad aguda grave



GHS09 Muy tóxico para la vida acuática



GHS07 Nocivo / irritante

H302 Nocivo en caso de ingestión. H331 Tóxico en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H319 Provoca irritación ocular grave. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672** Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-FU-05OI-B8.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato