

HERBICIDA AGRÍCOLA

GLIFOMATE GOLD 36 SL

Concentrado soluble (SL)

INGREDIENTE ACTIVO
**MCPA +
Glifosato**

CONCENTRACIÓN
**180 g/L + 180
g/L**

FORMULACIÓN
**Concentrado
soluble**

GRUPO
HRAC 4 (O)

REGISTRO MA
No. 6050

REENTRADA
48 horas

1 DESCRIPCIÓN

Herbicida hormonal selectivo para el control de malezas de hoja ancha y ciperáceas en arroz, caña y pastos. No controla gramíneas. Herbicida que mata casi toda maleza verde (gramíneas, hojas anchas, ciperáceas) por las hojas, hasta la raíz.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico, mimetiza la auxina natural provocando crecimiento descontrolado en malezas de hoja ancha. Herbicida sistémico no selectivo de postemergencia; inhibe la EPSP sintasa (síntesis de aminoácidos aromáticos).

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
MCPA Ácido fenoxiacético	180 g/L (18% p/v)
Glifosato Glicina sustituida (fosfoglucina)	180 g/L (18% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Ácido fenoxiacético / Glicina sustituida (fosfoglucina)

Grupo de resistencia: HRAC 4 (O) · HRAC 9 (G)

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Malezas que controla	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Malezas de hoja ancha y ciperáceas	3.0–5.0	—
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Malezas de hoja ancha (bejucos, Ipomoea spp.)	3.0–5.0	30 ‡
Pastos <i>Varias gramíneas forrajeras</i>	Malezas de hoja ancha	3.0–5.0	—

Reentrada: 48 horas.

Intervalo: Según presión de la plaga · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** 1 aplicación por ciclo (típico).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 MALEZAS QUE CONTROLA

- Malezas de hoja ancha y ciperáceas
- Malezas de hoja ancha
bejucos, Ipomoea spp.

6 INSTRUCCIONES DE USO

- Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
- Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
- No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección facial  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS III

BANDA

Banda azul · Clase OMS III



GHS05
Corrosivo



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H318 Provoca lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

