

HERBICIDA AGRÍCOLA

NEMAFORCE BALANCE 15 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO

Fostiazato

CONCENTRACIÓN

150 g/L

FORMULACIÓN

Concentrado
emulsionable

GRUPO

IRAC 1B

REGISTRO MA

No. 10140

REENTRADA

168 horas

1 DESCRIPCIÓN

Nematicida que protege las raíces contra nematodos formadores de agallas y de lesiones. Es muy tóxico: solo personal capacitado y con equipo de protección.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Nematicida/insecticida de suelo sistémico; inhibe la acetilcolinesterasa.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Fostiazato	150 g/L (15% p/v)
Organofosforado (tiazolidina)	
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Organofosforado (tiazolidina)

Grupo de resistencia: IRAC 1B

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Malezas que controla	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Nematodos del nudo (Meloidogyne spp.)	10-15	—
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Nematodos (Meloidogyne, Globodera, Pratylenchus) y gusano alambre	10-15	—
Banano/Plátano <i>Musa spp.</i>	Nematodos (Radopholus, Meloidogyne)	10-15	—

Reentrada: 168 horas.

Intervalo: Una aplicación por ciclo · Agua: 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15-20 L/ha con dron · Máx. por ciclo: 1 por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) 809-684-3478 / 3672
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puella 809-681-2913 / 6928



5 MALEZAS QUE CONTROLA

- **Nematodos del nudo**
Meloidogyne spp.
- **Nematodos**
Meloidogyne, Globodera, Pratylenchus

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: Atropina. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H301 Tóxico en caso de ingestión. H312 Nocivo en contacto con la piel. H332 Nocivo en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

