HERBICIDA AGRÍCOLA

PENDIFORCE PLUS 25 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	DENSIDAD (20 °C)
Pendimetalina + Flurocloridona	**130 g/L + 120 g/L**	**Concentrado emulsionable**	**HRAC 3 (K1)**	**No. 6042**	**0.98 g/ml**

1 DESCRIPCIÓN

Herbicida preemergente que controla gramíneas anuales y algunas malezas de hoja ancha antes de que nazcan. Se usa en cebolla, ajo, tomate, papa y maíz. Herbicida preemergente para malezas de hoja ancha y gramíneas, de uso poco común.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Preemergente/postemergente temprano, absorbido por raíces y brotes en germinación; inhibe la división celular (microtúbulos). Herbicida de suelo absorbido por brotes y raíces; inhibe la fitoeno desaturasa (síntesis de carotenoides), causando blanqueamiento.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Pendimetalina Dinitroanilina	130 g/L (13% p/v)
Flurocloridona Piridona (pirrolidinona)	120 g/L (12% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Dinitroanilina / Piridona (pirrolidinona)
Grupo de resistencia: HRAC 3 (K1) · HRAC 12 (F1)

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Malezas que controla	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Cebolla *Allium cepa*	Gramíneas anuales y hoja ancha en germinación	3.0–4.0	—
Ajo *Allium sativum*	Gramíneas anuales y hoja ancha en germinación	3.0–4.0	—
Tomate *Solanum lycopersicum*	Gramíneas anuales y hoja ancha	3.0–4.0	21
Papa *Solanum tuberosum*	Gramíneas anuales y hoja ancha	3.0–4.0	—
Maíz *Zea mays*	Gramíneas anuales y hoja ancha	3.0–4.0	—

Reentrada: 24 horas.
Intervalo: Según presión de la plaga · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Usualmente 1 aplicación por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-HE-04NU-81.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 MALEZAS QUE CONTROLA

- **Gramíneas anuales y hoja ancha en germinación**
- **Gramíneas anuales y hoja ancha**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN



Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD



Líquido concentrado



Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN



Utilice guantes



Utilice botas



Utilice overol



Protección boca y nariz



Protección ocular



Lávese después del uso

D AMBIENTE



Dañino para animales



Dañino para peces

E ENVASES



Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte. Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO Clase OMS III

BANDA Banda azul (PMS 293 C) · Categoría 4 · Clase OMS III



GHS07 Nocivo / irritante



GHS09 Muy tóxico para la vida acuática



GHS08 Peligro grave para la salud

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H360D Puede dañar al feto. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-HE-04NU-81.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato