

INSECTICIDA AGRÍCOLA

ARROJADOR 99 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO

**Aceite
parafrínico
(aceite minera...**

CONCENTRACIÓN

990 g/L

FORMULACIÓN

**Concentrado
emulsionable**

GRUPO

IRAC UNM

REGISTRO MA

No. 7651

REENTRADA

4 horas

1 DESCRIPCIÓN

Aceite mineral refinado de alta pureza para controlar cochinillas, ácaros, moscas blancas y como fungistático en banano. Mejora además la cobertura de otros productos en la mezcla.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Contacto físico: obstruye espiráculos y altera membranas de insectos, ácaros y hongos (asfixia); también adherente/coadyuvante.

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Aceite parafrínico (aceite mineral hortícola) Aceite mineral refinado (parafinas C20–C35)	990 g/L (99% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Aceite mineral refinado (parafinas C20–C35)
Grupo de resistencia: IRAC UNM

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Banano/Plátano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra y amarilla (<i>Pseudocercospora fijiensis</i> ; <i>Mycosphaerella musicola</i>) – portador/fungistático	1.0–2.0	0 ‡
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Minador de la hoja (<i>Phyllocnistis citrella</i>), cochinillas, ácaros, mosca blanca	1.0–2.0	0
Mango <i>Mangifera indica</i>	Cochinillas y escamas, ácaros	1.0–2.0	0 ‡
Aguacate <i>Persea americana</i>	Ácaros, trips, escamas	1.0–2.0	0 ‡
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), ácaros	1.0–2.0	0 ‡

Reentrada: 4 horas.

Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Evitar mezclar con azufre/captan o aplicar con temperaturas >32 °C (fitotoxicidad).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Sigatoka negra y amarilla** (*Pseudocercospora fijiensis*)
- **Mycosphaerella musicola** – portador/fungistático
- **Minador de la hoja** (*Phyllocnistis citrella*)
- **Cochinillas**
- **Ácaros**
- **Mosca blanca**
- **Cochinillas y escamas**
- **Trips**
- **Escamas**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS08
Peligro para la salud

No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

