

INSECTICIDA AGRÍCOLA

BENETRIN 25 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO

Cipermetrina

CONCENTRACIÓN

250 g/L

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable

GRUPO

IRAC 3A

REGISTRO MA

No. 2862

REENTRADA

12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Piretroide de amplio espectro con derribe rápido. Se usa en el campo contra orugas y chinches, y en salud pública para mosquitos, moscas y cucarachas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Modulador de canales de sodio dependientes de voltaje; contacto e ingestión, efecto de derribe.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Cipermetrina	250 g/L (25% p/v)
Piretroide (tipo II, ciano)	
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Piretroide (tipo II, ciano)

Grupo de resistencia: IRAC 3A

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Gusano del fruto, cogollero, mosca blanca	200–400 mL	0
Ají/Pimiento <i>Capsicum annum</i>	Gusanos, picudo	200–400 mL	0
Repollo/Brócoli <i>Brassica oleracea</i>	Palomilla dorso de diamante, orugas	200–400 mL	3
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Gusanos, diabrotica	200–400 mL	0
Maíz <i>Zea mays</i>	Cogollero, elotero	200–400 mL	1
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Pulguilla, gusanos	200–400 mL	14
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Chinche del arroz (<i>Oebalus</i> spp.), gusanos	200–400 mL	30 ‡

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: 7–10 días · Agua: 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · Máx. por ciclo: Máx. 4–6 aplicaciones por ciclo (según cultivo).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- Gusano del fruto
- Cogollero
- Mosca blanca
- Gusanos
- Picudo
- Palomilla dorso de diamante
- Orugas
- Diabrotica
- Elotero
- Pulguilla
- Chinche del arroz
Oebalus spp.

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H332 Nocivo en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

