INSECTICIDA AGRÍCOLA

EMAFORCE FENPIROXIMATE 10 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	DENSIDAD (20 °C)
Emamectina benzoato + Fenpiroxim...	50 g/L + 50 g/L	Concentrado emulsionable	IRAC 6	No. 5903	0.97 g/ml

1 DESCRIPCIÓN

Insecticida de origen natural muy potente contra orugas (cogollero, gusano del fruto, palomilla). Actúa a dosis muy bajas y deja de comer a la larva en pocas horas. Acaricida de contacto con derribe rápido contra ácaro rojo y otros ácaros fitófagos, también activo sobre mosca blanca.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Activador del canal de cloruro dependiente de glutamato; parálisis por ingestión y contacto, translaminar. Inhibidor del complejo I mitocondrial (METI); contacto con derribe rápido de ácaros en todos sus estados.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Emamectina benzoato Avermectina	50 g/L (5% p/v)
Fenpiroximato Pirazol (METI)	50 g/L (5% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Avermectina / Pirazol (METI)
Grupo de resistencia: IRAC 6 · IRAC 21A

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate *Solanum lycopersicum*	Gusano del fruto, Tuta absoluta, cogollero	400–600 mL	7
Ají/Pimiento *Capsicum annuum*	Gusanos del fruto, Spodoptera	400–600 mL	7
Repollo/Brócoli *Brassica oleracea*	Palomilla dorso de diamante, falso medidor	400–600 mL	7
Pepino *Cucumis sativus*	Gusano del pepino, cogollero	400–600 mL	3
Maíz *Zea mays*	Cogollero (Spodoptera frugiperda)	400–600 mL	7 ‡
Habichuela *Phaseolus vulgaris*	Orugas defoliadoras, Heliothis	400–600 mL	7 ‡

Reentrada: 12 horas.
Intervalo: 7–10 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 4 aplicaciones/ciclo (EPA, ≈0.034 kg i.a./ha/año en brásicas).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911
Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-IN-04JZ-07.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Gusano del fruto**
- **Tuta absoluta**
- **Cogollero**
- **Gusanos del fruto**
- **Spodoptera**
- **Palomilla dorso de diamante**
- **Falso medidor**
- **Gusano del pepino**
- **Orugas defoliadoras**
- **Heliothis**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN



Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD



Líquido concentrado



Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN



Utilice guantes



Utilice botas



Utilice overol



Utilice respirador



Protección facial



Lávese después del uso

D AMBIENTE



Dañino para animales



Dañino para peces

E ENVASES



Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO Clase OMS II

BANDA Banda amarilla (PMS 101 C) · Categoría 3 · Clase OMS II



GHS05 Corrosivo



GHS06 Toxicidad aguda grave



GHS08 Peligro grave para la salud



GHS09 Muy tóxico para la vida acuática

H301 Tóxico en caso de ingestión. H318 Provoca lesiones oculares graves. H331 Tóxico en caso de inhalación. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H330 Mortal en caso de inhalación. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-IN-04JZ-07.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato