

INSECTICIDA AGRÍCOLA

FIPROMATE 80 WG

Gránulos dispersables (WG)

INGREDIENTE ACTIVO

Fipronil

CONCENTRACIÓN

800 g/kg

FORMULACIÓN

Gránulos
dispersables

GRUPO

IRAC 2B

REGISTRO MA

No. 4822

REENTRADA

Al secar la
aspersión

1 DESCRIPCIÓN

Insecticida de amplio espectro y larga residualidad en el suelo; controla hormigas, termitas, gusanos del suelo, chinches y trips. Muy tóxico para abejas, por lo que exige manejo cuidadoso.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Bloquea canales de cloruro dependientes de GABA en el sistema nervioso del insecto; contacto e ingestión, sistémico.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Fipronil Fenilpirazol	800 g/kg (80% p/p)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Fenilpirazol
Grupo de resistencia: IRAC 2B

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (kg/ha)	Carencia (días)
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Comején, gusanos del suelo, salivazo	25-50 g	—
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Gorgojo acuático, chinche (tratamiento de semilla)	25-50 g	—
Maíz <i>Zea mays</i>	Gusanos del suelo, chinche (tratamiento de semilla)	25-50 g	90
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Gusanos del suelo, pulguilla	25-50 g	90
Pastos <i>Brachiaria spp.</i>	Hormigas, salivazo	25-50 g	—

Reentrada: Al secar la aspersión.

Intervalo: Según presión de la plaga · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15-20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** 1-2 aplicaciones por ciclo (según etiqueta).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- Comején
- Gusanos del suelo
- Salivazo
- Gorgojo acuático
- Chinche
tratamiento de semilla
- Pulguilla
- Hormigas

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis premezclada y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Material seco concentrado	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	--	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H301 Tóxico en caso de ingestión. H311 Tóxico en contacto con la piel. H331 Tóxico en caso de inhalación. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

