

REGULADOR DE CRECIMIENTO

EKO GIBERFLOR GOLD 10.25 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO

Ácido giberélico
(GA3) +
Citoqui...

CONCENTRACIÓN

90 g/L + 2.5
g/L + 2.5 g/L +
2.5 g/L + 2.5 g/L +
897.5 g/L

FORMULACIÓN

Suspensión
concentrada

GRUPO

—

REGISTRO MA

No. 6012

REENTRADA

4 horas

1 DESCRIPCIÓN

Jabones/humectantes agrícolas que hacen que el caldo se extienda y moje mejor la hoja, para que el producto penetre. Hormona natural de crecimiento que alarga tallos, estimula la floración y el cuajado y aumenta el tamaño de ciertos frutos....

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Reducen la tensión superficial: mejoran humectación, extensión y penetración foliar de bioestimulantes y agroquímicos. Fitohormona: estimula elongación celular, rompe dormancia, aumenta cuajado y tamaño de fruto. Fitohormona:...

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Ácido giberélico (GA3) Giberelina (diterpenoide)	90 g/L (9% p/v)
Citoquininas (kinetina / 6-bencilaminopurina / zeatina) Citoquinina (adenina sustituida)	2.5 g/L (0.25% p/v)
Oligosacarinas (oligosacáridos de pared celular) Oligosacáridos bioactivos (pectina, xiloglucano, quitosano)	2.5 g/L (0.25% p/v)
Brasinoesteroides (brasinólida / epibrasinólida) Esteroides vegetales (fitohormona)	2.5 g/L (0.25% p/v)
Ácido abscísico (S-ABA) Sesquiterpenoide (fitohormona)	2.5 g/L (0.25% p/v)
Hexanoato de 2-dietilaminoetilo (DA-6) Éster aminico (regulador de crecimiento sintético)	2.5 g/L (0.25% p/v)
Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes) Mezcla de tensoactivos no iónicos/aniónicos (etoxilatos, alquil-poliglucósidos)	897.5 g/L (89.75% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Mezcla de tensoactivos no iónicos/aniónicos (etoxilatos, alquil-poliglucósidos) / Giberelina (diterpenoide) / Citoquinina (adenina sustituida) / Oligosacáridos bioactivos (pectina, xiloglucano, quitosano) / Esteroides vegetales...

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Efecto / momento	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Todos los cultivos —	Humectante/penetrante en mezclas foliares	100–200 mL	0 ‡
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Humectante en aplicaciones foliares	100–200 mL	0 ‡
Banano/Plátano <i>Musa spp.</i>	Humectante	100–200 mL	0 ‡

Reentrada: 4 horas.

Intervalo: según producto asociado · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · Respete el máximo de aplicaciones de la etiqueta.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 EFECTOS EN EL CULTIVO

- Humectante/penetrante en mezclas foliares
- Humectante en aplicaciones foliares
- Humectante

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS III

BANDA

Banda azul · Clase OMS III



GHS07
Nocivo / irritante

H319 Provoca irritación ocular grave. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H302 Nocivo en caso de ingestión. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la...

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

