REGULADOR DE CRECIMIENTO

GIBERFLOR SILVER 10 TB

Tabletas (TB)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	REENTRADA
Ácido giberélico (GA3)	—	**Tabletas**	—	**No. 7483**	**4 horas**

1 DESCRIPCIÓN

Hormona natural de crecimiento que alarga tallos, estimula la floración y el cuajado y aumenta el tamaño de ciertos frutos. Se aplica en dosis muy bajas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Fitohormona: estimula elongación celular, rompe dormancia, aumenta cuajado y tamaño de fruto.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Ácido giberélico (GA3) Giberelina (diterpenoide)	Según etiqueta registrada
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Giberelina (diterpenoide)
Grupo de resistencia: No aplica

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Efecto / momento	Dosis (kg/ha)	Carencia (días)
Cítricos *Citrus spp.*	Cuajado de fruto, retraso de senescencia de la cáscara	10–20 g	0
Arroz *Oryza sativa*	Producción de semilla híbrida / vigor	10–20 g	0 ‡
Tomate *Solanum lycopersicum*	Cuajado en condiciones de calor (uso en mezcla)	10–20 g	0 ‡
Papa *Solanum tuberosum*	Ruptura de dormancia del tubérculo semilla	10–20 g	0 ‡
Cebolla *Allium cepa*	Estimulación de crecimiento (uso en mezcla)	10–20 g	0 ‡

Reentrada: 4 horas.
Intervalo: 10–21 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Usualmente 1–3 aplicaciones por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-RC-05RV-97.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 EFECTOS EN EL CULTIVO

- **Cuajado de fruto**
- **Retraso de senescencia de la cáscara**
- **Producción de semilla híbrida / vigor**
- **Cuajado en condiciones de calor** *uso en mezcla*
- **Ruptura de dormancia del tubérculo semilla**
- **Estimulación de crecimiento** *uso en mezcla*

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis premezclada y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN



Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD



Material seco concentrado



Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN



Utilice guantes



Utilice botas



Utilice overol



Protección boca y nariz



Protección ocular



Lávese después del uso

D AMBIENTE



Dañino para animales

E ENVASES



Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN Clase OMS U

BANDA Banda verde (PMS 347 C) · Categoría 5 · Clase OMS U



GHS07
Nocivo / irritante

No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-RC-05RV-97.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato