

REGULADOR DE CRECIMIENTO

KELOM ETEFON 40 SL

Concentrado soluble (SL)

INGREDIENTE ACTIVO
Etefón (ácido 2-cloroetilfosfónico...)

CONCENTRACIÓN
400 g/L

FORMULACIÓN
Concentrado soluble

GRUPO
—

REGISTRO MA
No. 3086

REENTRADA
48 horas

1 DESCRIPCIÓN

Producto que libera etileno para uniformar la floración de la piña, madurar tomate/café/cítricos y controlar caída de frutos. Se aplica en dosis exactas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Se absorbe y descompone en etileno dentro de la planta (pH > 4), induciendo maduración, floración y abscisión.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Etefón (ácido 2-cloroetilfosfónico) Organofosforado liberador de etileno (regulador)	400 g/L (40% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Organofosforado liberador de etileno (regulador)
Grupo de resistencia: No aplica

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Efecto / momento	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Piña <i>Ananas comosus</i>	Inducción floral uniforme	1.0–2.0	2
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Maduración uniforme del fruto	1.0–2.0	3
Café <i>Coffea arabica</i>	Maduración uniforme de cerezas	1.0–2.0	—
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Desverdizado y color de cáscara	1.0–2.0	1
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Amarillamiento / maduración de hoja	1.0–2.0	2

Reentrada: 48 horas.

Intervalo: según cultivo (7–14 días) · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Normalmente 1–2 aplicaciones por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 EFECTOS EN EL CULTIVO

- Inducción floral uniforme
- Maduración uniforme de cerezas
- Desverdizado y color de cáscara
- Amarillamiento / maduración de hoja
- Maduración uniforme del fruto

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección facial  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: Atropina. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS05
Corrosivo



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

