INSECTICIDA DE SALUD PÚBLICA

CUCARAFORCE 1.05 GL

Gel (GL)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	DENSIDAD (20 °C)
Abamectina + Imidacloprid	**0.5 g/L + 10 g/L**	**Gel**	**IRAC 4A**	**No. 5427**	**1.27 g/ml**

1 DESCRIPCIÓN

Insecticida sistémico que controla mosca blanca, pulgones, trips, chinches, cochinillas y gusanos del suelo. En salud pública se usa en cebos y tratamientos contra cucarachas y hormigas. Insecticida y acaricida de origen natural (fermentación de Streptomyces avermitilis) con efecto translaminar.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Agonista del receptor nicotínico de acetilcolina; sistémico (xilema), contacto e ingestión. Activa el canal de cloruro dependiente de glutamato (y GABA) en insectos y ácaros; acción translaminar y por ingestión/contacto.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Abamectina Avermectina	0.5 g/L (0.05% p/v)
Imidacloprid Neonicotinoide (cloronicotinilo)	10 g/L (1% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Neonicotinoide (cloronicotinilo) / Avermectina
Grupo de resistencia: IRAC 4A · IRAC 6

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / sitio	Dosis de uso	Carencia (días)
Tomate *Solanum lycopersicum*	Mosca blanca (Bemisia tabaci), pulgones, trips	Gotas de 0.1 g (tamaño de una lenteja) cada 30–50 cm en grietas y escondites; 1–2 g por m² infestado	7
Ají/Pimiento *Capsicum annuum*	Mosca blanca, pulgones, picudo	Gotas de 0.1 g (tamaño de una lenteja) cada 30–50 cm en grietas y escondites; 1–2 g por m² infestado	7
Repollo/Brócoli *Brassica oleracea*	Pulgones, mosca blanca	Gotas de 0.1 g (tamaño de una lenteja) cada 30–50 cm en grietas y escondites; 1–2 g por m² infestado	7
Papa *Solanum tuberosum*	Pulgón, pulguilla, escarabajo	Gotas de 0.1 g (tamaño de una lenteja) cada 30–50 cm en grietas y escondites; 1–2 g por m² infestado	14
Pepino *Cucumis sativus*	Mosca blanca, pulgones	Gotas de 0.1 g (tamaño de una lenteja) cada 30–50 cm en grietas y escondites; 1–2 g por m² infestado	7
Cítricos *Citrus spp.*	Psílido asiático, minador, pulgones	Gotas de 0.1 g (tamaño de una lenteja) cada 30–50 cm en grietas y escondites; 1–2 g por m² infestado	7
Café *Coffea arabica*	Minador, broca, cochinillas	Gotas de 0.1 g (tamaño de una lenteja) cada 30–50 cm en grietas y escondites; 1–2 g por m² infestado	14 ‡

Reentrada: 12 horas.
Intervalo: 7–14 días · **Agua:** según el equipo y la superficie a tratar · **Máx. por ciclo:** Máx. ≈0.45 kg i.a./ha/año (EPA, hortalizas).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-SP-046R-1B.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Mosca blanca** *Bemisia tabaci*
- **Pulgones**
- **Trips**
- **Picudo**
- **Pulgón**
- **Pulguilla**
- **Escarabajo**
- **Psílido asiático**
- **Minador**
- **Broca**
- **Cochinillas**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
2. Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
3. Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No mezclar con otros productos salvo indicación técnica. No aplicar sobre alimentos, utensilios ni superficies donde se preparen alimentos.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN



Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD



Líquido concentrado



Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN



Utilice guantes



Utilice botas

Utilice overol



Utilice respirador



Protección ocular



Lávese después del uso

D AMBIENTE



Dañino para animales



Dañino para peces

E ENVASES



Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte. Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO Clase OMS U

BANDA Banda verde (PMS 347 C) · Categoría 5 · Clase OMS U



GHS07 Nocivo / irritante



GHS09 Muy tóxico para la vida acuática



GHS06 Toxicidad aguda grave



GHS08 Peligro grave para la salud

H302 Nocivo en caso de ingestión. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H300 Mortal en caso de ingestión. H330 Mortal en caso de inhalación. H361d Se sospecha que daña al feto. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-SP-046R-1B.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato