

RODENTICIDA

RATONMATE PLUS 0.005 BB

Cebo en bloques (BB)

INGREDIENTE ACTIVO

Bromadiolona

CONCENTRACIÓN

0.05 g/kg

FORMULACIÓN

Cebo en bloques

GRUPO
IRAC/RRAC
Grupo 2
(anticoagulante de 2ª gen.)

REGISTRO MA

No. 5660

REENTRADA

Según etiqueta

1 DESCRIPCIÓN

Rodenticida anticoagulante en cebo para controlar ratas y ratones. Muy tóxico para otros mamíferos y aves si comen el cebo.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Inhibe la vitamina K epóxido reductasa; impide la coagulación y causa hemorragias fatales en 3-7 días.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Bromadiolona Anticoagulante cumarínico de segunda generación	0.05 g/kg (0.005% p/p)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Anticoagulante cumarínico de segunda generación

Grupo de resistencia: IRAC/RRAC Grupo 2 (anticoagulante de 2ª gen.)

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / sitio	Dosis de uso	Carencia (días)
Interior doméstico/bodegas (estaciones de cebo)	Rata negra (<i>Rattus rattus</i>), rata noruega (<i>R. norvegicus</i>), ratón (<i>Mus musculus</i>)	1-2 bloques (20-40 g) por estación de cebado cada 5-10 m	—
Peridomicilio y alrededores de silos y granjas	Ratas y ratones de campo	1-2 bloques (20-40 g) por estación de cebado cada 5-10 m	—
Alcantarillas/basureros	Ratas	1-2 bloques (20-40 g) por estación de cebado cada 5-10 m	—

Reentrada: Según etiqueta.

Intervalo: Reponer cebo según consumo hasta no haber actividad (típicamente 1-3 semanas) · **Agua:** según el equipo y la superficie a tratar · **Máx. por ciclo:** Solo con estaciones seguras (ANTIDOTE); proteger de niños y mascotas.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Rata negra**
Rattus rattus
- **Rata noruega**
R. norvegicus
- **Ratón**
Mus musculus
- **Ratas y ratones de campo**
• **Ratas**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
2. Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
3. Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Material seco concentrado Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	--	---	--	---

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte. Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: Vitamina K1 (fitomenadiona). Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H300 Mortal en caso de ingestión. H310 Mortal en contacto con la piel. H330 Mortal en caso de inhalación. H360D Puede dañar al feto. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

